

四、责任与义务



丙肝患者的合法权益受法律保护，但故意传播丙肝的行为要承担法律责任。



丙肝防治宣传教育 核心信息

男性同性性行为人群



磴口县疾病预防控制中心


一、危害性认识

- 📖 丙肝是一种以**隐匿性感染**为主、**对健康危害较大**的传染病。
- 📖 我国丙肝感染人数众多，传染源广泛存在。
- 📖 **吸毒、性乱**、有可能造成血液交换的行为是**导致丙肝感染**的主要原因。
- 📖 丙肝是由丙肝病毒引起的、以肝脏病变为主的传染病，常呈**隐匿性感染**状态。
- 📖 丙肝慢性化率高达**60-80%**，可导致肝脏慢性炎症、坏死和纤维化，**15-20%**的慢性丙肝患者可进一步发展为肝硬化或肝癌，对健康和生命危害较大。



二、预防知识

- 👨 目前无有效预防丙肝的疫苗，**拒绝毒品、避免高风险行为**是预防丙肝的根本措施。
- 👨 性行为中坚持**正确使用安全套**，可有效降低感染和传播丙肝的风险。



三、检测与治疗

- 🔬 不能通过外表判断一个人是否感染了丙肝病毒。
- 🔬 定期进行丙肝检测，**早发现、早诊断、早治疗**。
- 🔬 丙肝可以治愈。通过规范的抗病毒治疗，95%以上的丙肝患者可以完全治愈。及早治愈丙肝，就可以避免由慢性丙肝进展为肝硬化及肝癌，还可以防止丙肝进一步传染给他人。
- 🔬 国家已将部分丙肝抗病毒治疗药物纳入医保报销范围。



四、责任与义务



丙肝患者的合法权益受法律保护，但故意传播丙肝的行为要承担法律责任。



丙肝患者
不得以任何方式
故意传播丙肝病毒

丙肝防治宣传教育 核心信息

吸毒人群



磴口县疾病预防控制中心

一、危害性认识

- 目前，丙肝是一种危害大、病死率较高的严重传染病。吸毒人群是受丙肝威胁最严重的群体。
- 共用注射针具是丙肝在吸毒人群中传播的最主要途径。
- 吸食新型毒品会增大感染丙肝的风险。
- 丙肝是由丙肝病毒引起的、以肝脏病变为主的传染病，常呈隐性感染状态。
- 丙肝慢性化率高达60-80%，可导致肝脏慢性炎症、坏死和纤维化，15-20%的慢性丙肝患者可进一步发展为肝硬化或肝癌，对健康和生命危害较大。



二、预防知识

- 丙肝病毒通过血液、性接触和母婴三种途径传播。
- 丙肝目前无有效预防的疫苗，拒绝毒品、避免共用注射针具、避免高风险行为是预防丙肝的根本措施。
- 戒毒药物维持治疗可以降低由吸毒造成的感染丙肝病毒的风险。
- 坚持正确使用安全套，可有效减少感染和传播丙肝的风险。

拒绝毒品
避免共用注射针具
避免高风险行为
正确使用安全套



三、检测与治疗

- 不能通过外表判断一个人是否感染了丙肝病毒。
- 定期进行丙肝检测，早发现、早诊断、早治疗。
- 丙肝可以治愈。通过规范的抗病毒治疗，95%以上的丙肝患者可以完全治愈。及早治愈丙肝，就可以避免由慢性丙肝进展为肝硬化及肝癌，还可以防止丙肝进一步传染给他人。
- 国家已将部分丙肝抗病毒治疗药物纳入医保报销范围。



四、责任与义务



与丙肝患者的日常接触不会被感染，不要歧视丙肝患者。



预防丙肝需要每个人、每个家庭和全社会的参与。



丙肝防治宣传教育 核心信息

大众人群



磴口县疾病预防控制中心

一、危害性认识

 丙肝是一种以慢性隐匿性感染为主、对健康危害较大的传染病，目前没有有效预防的疫苗。

 我国丙肝病毒感染人数众多，传染源广泛存在。

 丙肝是由丙肝病毒引起的、以肝脏病变为主的传染病，常呈隐匿性感染状态。

 丙肝慢性化率高达60-80%，可导致肝脏慢性炎症、坏死和纤维化，15-20%的慢性丙肝患者可进一步发展为肝硬化或肝癌，对健康和生命危害较大。



二、预防知识

 丙肝病毒通过血液、性接触和母婴三种途径传播。

 拒绝毒品、做好个人防护是预防丙肝的根本措施。

 合理安全用血可有效控制丙肝病毒传播风险。

 拒绝不安全性行为，做好自身防护是最有效的预防手段。

 感染丙肝的妇女应及时治疗，治愈前应避免怀孕。



三、检测与治疗

 丙肝患者大多无明显症状和体征，及早检测是发现丙肝的唯一方法。

 丙肝可以治愈。通过规范的抗病毒治疗，95%以上的丙肝患者可以完全治愈。及早治愈丙肝，就可以避免由慢性丙肝进展为肝硬化及肝癌，还可以防止丙肝进一步传染给他人。

 国家已将部分丙肝抗病毒治疗药物纳入医保报销范围。

