


# 守规矩 “梅”烦恼

梅毒螺旋体就在我们身边存在



如果进入人体  
不规范治疗  
就会让人烦恼



但只要守规矩  
“梅”法攻击，你无烦恼

## 梅毒——它从哪里来？

历史流传着这样的故事

在 15 世纪的大航海时代  
法国人和一些染病的西班牙人一起侵略了意大利  
战争结束后  
法国军队返回欧洲各地  
此后，仅仅 25 年  
梅毒就遍布了欧亚大陆  
直到 1530 年  
一个意大利人写了首诗来给世人科普梅毒  
**Syphilis: sive de morbo Gallico**  
诗中的主人公 Syphilis 的名字  
就成了梅毒的正式名称



也因为患上梅毒后皮肤溃烂部分呈梅花的形状  
所以这种病又被称作“梅毒”

## 看看梅毒祸及人数

梅毒在全世界流行  
据 WHO 估计，全球每年约有 1200 万新发病例

近年来，梅毒也是我国报告病例数最多的性病

据官方最新通报数据

仅 2024 年 6 月份

全国共报告梅毒发病 54760 例、死亡 5 例



国家疾病预防控制中心  
National Disease Control and Prevention Administration

长微博 | 无障碍 | 邮箱

三

首页

机构概况

新闻资讯

政务公开

在线服务

互动交流

当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 疫情信息

2024年6月全国法定传染病疫情概况

日期: 2024-07-29 来源: 监测预警司

字号: [ 大 中 小 ]

分享到: 

2024年6月（6月1日0时至6月30日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病1117408例，死亡2254人。

甲类传染病无发病、死亡病例报告。

乙类传染病中，除新型冠状病毒感染外，共报告发病390682例，死亡2253人。传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、百日咳、肺结核、梅毒及猩红热，占乙类传染病报告病例总数的93.0%。

同期，丙类传染病共报告发病726726例，死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，占丙类传染病报告病例总数的98.1%。

附件: 2024年6月全国法定传染病报告发病、死亡统计表

附件

2024年6月全国法定传染病报告发病、死亡统计表<sup>#</sup>

| 病名 | 发病数   | 死亡数 <sup>*</sup> |
|----|-------|------------------|
| 淋病 | 8396  | 0                |
| 梅毒 | 54760 | 5                |

甘肃省同期报告梅毒发病 818 例、死亡 0 例



甘肃省疾病预防控制中心  
GANSU PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION



厚德敬业 科学预防  
拼搏奉献 守卫健康

网站首页

机构信息

动态信息

党群工作

工作重点

健康主题

办事服务

专业服务

交流互动

请输入关键词

高级检索

您的位置: 首页 > 工作重点 > 传染病信息 > 疫情信息通报

2024年6月甘肃省法定传染病疫情公布

来源: 甘肃疾控 发布时间: 2024-07-08 打印文章 字体: [ 大 中 小 ]

2024年6月，全省无甲类传染病报告；乙、丙类传染病报告23种15757例，死亡29例。本月报告乙类传染病15种5950例，死亡29例；报告丙类传染病8种9807例，无死亡病例的报告。

全省报告发病数居前五位乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、百日咳和布病感染，占乙类传染病发病总数的80.07%。

全省报告发病数居前五位丙类传染病是流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎，占丙类传染病发病总数的99.84%。

本月气温持续升高，肠道传染病发病上升，各地要进一步加强霍乱、细菌性痢疾、其它感染性腹泻病等肠道传染病监测与防控，做好重大疫情应对处置的准备工作。尤其是我省已进入手足口病高发期，各级医疗卫生机构要加强手足口病重症病例的早期诊断和及时救治，疾控机构要与相关部门协作，做好托幼机构和学校等重点场所手足口病防控工作。

2024年6月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表

| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
|----|-----|-----|
| 淋病 | 68  | 0   |
| 梅毒 | 818 | 0   |

## 细说梅毒

梅毒是由梅毒螺旋体引起的一种常见的慢性性传播疾病，与尖锐湿疣、生殖器疱疹等其他性传播疾病不同，梅毒可以侵犯全身各个器官，产生多种多样的临床症状和体征。

同时，它可以多年处于潜伏期而没有临床症状。因此，它是性病的“潜伏”高手，也是我国目前重点防治的性传播疾病之一。

### 梅毒的传播源

梅毒是人类独有的疾病，显性和隐性梅毒患者是传染源，感染梅毒的人的皮损及其分泌物、血液中含有梅毒螺旋体。

### 梅毒的传播途径

- 1、性传播：**性接触是梅毒的主要传播途径，它占 95%以上。
- 2、血液传播：**个别患者可通过输入有传染性梅毒患者的血液而感染。
- 3、母婴传播：**患有梅毒的孕妇可通过胎盘传染给胎儿，引起胎儿宫内感染，可导致流产、早产、死胎或分娩胎传梅毒儿。一般认为孕妇梅毒病期越早，对胎儿感染的机会越大。孕妇即使患有无症状的隐性梅毒还具有传染性。




## 梅毒的临床表现及分类

梅毒按照其发病时间、临床表现及传染方式，可分为一期梅毒、二期梅毒、三期梅毒、神经梅毒、隐性梅毒及先天梅毒等。

### 先天性梅毒

### 获得性梅毒（后天）



## 1、一期梅毒：“伪装者”

①硬下疳：潜伏期一般为 2-4 周。常单发，也可多发。初为粟粒大小高出皮面的结节，后可发展成直径 1-2 cm 的圆形或椭圆形浅在溃疡。典型的硬下疳界限清楚、边缘略隆起，质韧，疮面较平坦、清洁。未经治疗，数周后，可自行消退。但是自行消退不代表好转了，梅毒螺旋体还潜伏在身



体中，正悄无声息地侵入血液。一期梅毒的伪装看似“天衣无缝”，但还是露出了破绽，如果您出现了硬下疳和淋巴结肿大的症状，并且近期有过高危行为，就应及时就医，并进行梅毒检测。

②腹股沟或皮损近卫淋巴结肿大：可为单侧或双侧，无痛，相互孤立而不粘连，质中，不化脓破溃，表面皮肤无红、肿、热，可有轻度压痛。



## 2、二期梅毒：顺着淋巴和血液“攻击”你

可有一期梅毒史（常在硬下疳发生后 4-6 周出现），病程在 2 年以内。

①皮肤黏膜损害：可模拟各种皮肤病损害，分布于躯体和四肢头面部等部位，常泛发对称。二期复发梅毒皮损数目较少，皮损形态奇特，常呈环状或弓形、弧形。扁平湿疣是二期梅毒的一种较为特异的皮肤黏膜损害，好发于外阴、肛周、乳房下等易摩擦浸渍部位。湿性丘疹形如扁豆，表面湿烂，有少量渗液，含大量梅毒螺旋体，传染性强。可融合成斑块，有时呈疣状或乳头瘤状，分泌物有臭味。

②全身浅表淋巴结可肿大。

③可出现梅毒性骨关节、眼、内脏及神经系统损害等。



**二期梅毒变化多端，并且与很多皮肤病的症状非常相似，如果患者掉以轻心，没有及时治疗，二期梅毒的症状可能会自行消退，潜踪隐迹，但梅毒的威胁依然存在着！**


### **3、三期梅毒：“杀手”**

可有一期或二期梅毒史。病程2年以上。

①晚期良性梅毒：皮肤黏膜损害，头面部及四肢伸侧的结节性梅毒疹，大关节附近的近关节结节，皮肤、口腔、舌咽部树胶肿，上腭及鼻中隔黏膜树胶肿可导致上腭及鼻中隔穿孔和马鞍鼻；骨梅毒和其他内脏梅毒。

②心血管梅毒：可发生单纯性主动脉炎、主动脉瓣闭锁不全、主动脉瘤、冠状动脉狭窄、心绞痛等。

梅毒发病后的症状各式各样，甚至有医生以“伟大的模仿者”来形容。



**三期梅毒的 梅毒螺旋体会侵犯中枢神经系统、心血管系统、眼、皮肤和其他内部脏器，人可能残疾，甚至危及生命。**


#### 4、隐性梅毒：“潜伏者”

隐性梅毒也被称为潜伏梅毒，因为一少部分人感染了梅毒螺旋体后，在体内可终身隐伏（血清反应阳性，而无症状和病变），或在二、三期梅毒活动，局部病变消失而血清反应阳性。它一直潜藏在患者的身体中，随时会“东山再起”。

### 梅毒有药可医

1928 年英国细菌学家弗莱明发明了青霉素

让梅毒这种病有药可治





只要及时发现、积极配合规范治疗。

“梅”有医治，你无烦恼。

**梅毒是可以治愈的**



## 梅毒抗体阳性一定是梅毒吗？

每当体检、献血、或者住院的时候

可能被告知梅毒抗体阳性

一定是梅毒吗？

梅毒诊断方法是血清学检测（抽血化验）。它常分为两类：梅毒非特异性抗体试验和梅毒特异性抗体试验。

| 试验结果    |          | 参考结果解释*          |
|---------|----------|------------------|
| 特异性梅毒抗体 | 非特异性梅毒抗体 |                  |
| 阳性      | 阳性       | 可能为现症梅毒          |
| 阴性      | 阳性       | 非梅毒螺旋体血清试验假阳性    |
| 阳性      | 阴性       | 临床治愈的早期梅毒（既往感染者） |
| 阴性      | 阴性       | 排除梅毒感染或极早期梅毒     |

## 梅毒预防措施

目前尚无预防梅毒的有效疫苗，因此最重要的是采取以下行为进行预防：

- 1、树立正确性观念，保持单一性伴侣，正确使用安全套，洁身自爱。
- 2、避免饮酒、毒品等会增加不安全性行为风险的因素。
- 3.高风险备孕人群应接受梅毒检查，如果是孕妇感染者应及时接受治疗以预防新生儿感染。
- 4、如果发现生殖器破溃、皮疹、分泌物异常，要及时到正规医疗机构就诊。
- 5、如果确诊感染梅毒，要遵照医嘱用药，做到全程、足量、规范地使用药物，并按照要求定期复查。应及时通知性伴侣进行专业检测，避免错过治疗最佳时机。



科学认识梅毒，守规矩，健康没烦恼！

作者：赵银龙、卢娟丽