

什么是艾滋病？

艾滋病是一种严重危害人类健康的慢性传染性疾病，艾滋病病毒侵入人体后，会在体内不断复制，逐渐破坏人体免疫功能，使人体抵御疾病的能力降低，易发生多种感染和肿瘤，最终导致死亡。目前还没有可治愈的药物，也没有可供预防的有效疫苗。但已有较好的治疗方法，那就是1996年美籍华人何大一教授提出的“鸡尾酒疗法”。

一、什么是鸡尾酒疗法？

鸡尾酒疗法简单来说就是通过三种或三种以上的抗病毒药物联合使用来治疗艾滋病。该疗法的应用可以减少单一用药产生的抗药性，最大限度地抑制病毒的复制，使被破坏的机体免疫功能部分甚至全部恢复，从而延缓病程进展，延长患者生命，提高生活质量。

目前国际上共有六大类30多种抗反转录病毒药物，分为核苷类反转录酶抑制剂（NRTIs）、非核苷类反转录酶抑制剂（NNRTIs）、蛋白酶抑制剂（PIs）、整合酶抑制剂（INSTIs）、融合抑制剂（FIs）及CCR5抑制剂剂。

二、什么时候启动艾滋病抗病毒治疗，能不能停药？

一旦诊断艾滋病病毒感染，无论CD4细胞计数多少，应尽快开始抗病毒治疗。在特定情况，如需要处理的严重并发症或合并症，可以先治疗其他疾病，病情稳定后尽快开展抗病毒治疗。感染艾滋病病毒后，越早发现、早诊断、早治疗对控制疾病进展有利。

尽早启动抗病毒治疗，可以减少药物毒副作用，减少耐药。抗病毒治疗开始后不能随意中断，遇到特殊情况需要中断服药，应该在医生指导下规范停药。感染者擅自停药、漏药会引发血浆病毒载量反弹，从而导致发生耐药突变的病毒株滋生，引发药物耐药。

停药后如需再次启动抗病毒治疗，不要擅自服用之前的药物，要由医生判断，是否继续服用原来的方案，还是进一步完善检测，更换药物方案。





艾滋病法律政策

AIDS

艾滋病病毒感染者也是艾滋病的受害者，应该得到理解和关心，已知感染艾滋病后要及时告知与自己发生性关系者，故意传播艾滋病的行为既不道德也要承担法律责任。

艾滋病威胁着每一个人和每一个家庭，预防艾滋病是全社会的责任。

艾滋病发生暴露后怎么办？



发生高危性行为
或与艾滋病病人
血液有接触后，
尽可能在2小时内

不超过72小时到艾滋病病毒暴露后预防
门诊点服用艾滋病阻断药物，用药疗程
为28天。

不冷漠 不歧视
防治艾滋病 你我同参与



扫码关注

多一分理解和关怀 少一分歧视和冷漠


预防艾滋病 你我同参与



NO爱NO伤害

WALTOON CHUYTTRCH PRAYER
MAIN PALAZA NEAR DEN

Love Kiss Bash



余江区疾病预防控制中心