


2 艾滋病知识您了解多少?

艾滋病是指由人类免疫缺陷病毒，即艾滋病病毒（HIV）引起的获得性免疫缺陷综合征。


艾滋病病毒侵入人体后，破坏人体的免疫功能，是人体发生多种感染和肿瘤，最终导致死亡，它是一种危害大、病死率高的严重传染病。但也是可以预防的。



2 艾滋病传播途径

性传播：青少年草

率的异性发生性行为不仅无力承担可能带来的责任和义务，而且有可能感染性病和艾滋病，男男同性恋和多性伴侣危险更大。



血液传播：共用注射器吸毒、到非法血站卖


血、输入被病毒污染的血液和血制品、使用未经严格消毒的针具、器械等可能传播。

母婴传播：感染了艾滋病的妇女在怀孕、分娩和哺乳时，可以把病毒传染给婴儿。

2 AIDS 有什么症状?

从感染

艾滋病病毒到发病有一个完整的自然过程。



急性感染期仅表现为发热、皮疹、淋巴结肿大、还会发生乏力、出汗、恶心、呕吐、腹泻、咽炎等非特异性病状。

潜伏期 感染者可以没有任何临床症状，艾滋病的平均潜伏期，一般认为是2-10年。

潜伏期后开始出现与艾滋病有关的症状和体征，这时，病人已具备了艾滋病有关的症状和体征。

常见症状有：A. 主要是浅表淋巴结肿大。B. 病毒性病病的全身不适，肌肉疼痛等症状。C. 各种感染特殊性或复发性的非致命性感染。

典型的艾滋病期，病人一般具有三个基本特点：A. 严重的细胞免疫缺陷。B. 发生各种致命性机会性感染。C. 发生各种恶性肿瘤。艾滋病的终期，免疫功能全面崩溃，病人出现各种严重的综合病症，直至死亡。

确诊艾滋病不能光靠临床表现，最重要的根据是检查者的血液检测是否为阳性结果，所以怀疑自身感染 HIV 后应当及时到当地的卫生检疫部门做检查，千万不要自己乱下诊断。

艾滋病虽

然很可怕，但它不会通过我们日常的生活来传播，也就是说，我们不会经浅吻、握手、拥抱、共餐、共用办公用品、共同厕所、游泳池、甚至照料 HIV 感染者或艾滋病患者都没有关系。



2 三种途径能传播，重在预防

艾滋病病毒经性接触、血液和母婴三种途径传播，采取积极措施，完全可以预防和控制艾滋病的传播。





中国人民解放军
第九一〇医院

自我预防，远离艾滋

1、预防性途径感染艾滋病病毒

● 遵守性道德，不发生夫妻以外的性行为是预防经性传播艾滋病的有效措施，正确使用安全套可降低感染艾滋病的危险。


2、预防血液途径感染艾滋病病毒

● 远离毒品，抵制毒品。禁止共用注射器注射毒品，对于暂时不能戒除毒瘾的人可用美沙酮替代疗法来避免共用针具感染；


不去非法采血点卖血，更不接受未经艾滋病病毒检测合格的血液或血制品，不使用未经严格消毒的注射器。

3、预防母婴途径感染艾滋病病毒

● 感染艾滋病病毒的妇女要避免怀孕，一旦怀孕要在医生的指导下考虑是否终止妊娠；选择继续妊娠者应进行抗病毒药物干预并采取严格的措施避免分娩过程中感染给他人，产后避免对新生儿进行母乳喂养。



预防艾滋病的 10 条基本知识



- 1、艾滋病是一种病死率极高的严重传染病，目前还没有治愈的药方，但可以预防。
- 2、艾滋病主要通过性接触、血液和母婴三种途径传播
- 3、与艾滋病病人和艾滋病病毒感染者的日常生活和工作接触不会感染艾滋病。
- 4、洁身自爱、遵守性道德是预防经性感染艾滋病的根本措施。
- 5、正确使用安全套不仅能避孕，还能减少感染艾滋病、性病的危险。
- 6、及早治疗并治愈性病可减少感染艾滋病的危险。
- 7、共用注射器是传播艾滋病的重要途径，因此要拒绝毒品，珍爱生命。
- 8、避免不必要的输血和注射，避免使用未经艾滋病病毒抗体检测的血液和血液制品。
- 9、关心、帮助和不歧视艾滋病病人及艾滋病病毒感染者是预防和控制艾滋病的重要方面。
- 10、艾滋病威胁着每一个人和每一个家庭，预防艾滋病是全社会的责任。



主动检测


知艾防艾

共享健康

Know your status



疾病预防控制科 宣



PITC (Provider-initiated HIV Testing and Counseling):
医务人员主动为前来医疗机构就诊的患者提供HIV检测咨询，尽多尽早地发现感染者并建立与预防、治疗关怀的链接机制，把这项服务作为医疗关怀的一个组成部分。

◆ **遵循知情不拒绝：**患者在接受了检测前提供的信息后，不对检测“提出拒绝”，则视为同意接受HIV检测；

◆**非歧视：**不因就诊者选择拒绝接受艾滋病检测，或出现检测结果阳性而取消医疗服务或降低服务质量。

◆**咨询与结果告知：**医务人员将HIV检测结果告知就诊者，对HIV阳性者提供检测后咨询（包括结果解释、预防措施、服务信息等）。

◆**转介与后续服务：**在PITC服务中，对HIV检测阴性者提供预防信息，采取预防措施，避免感染；HIV检测阳性者提供针对性的咨询和转介服务，包括复查和确证、预防、治疗等信息及CD4检测、随访、抗病毒治疗、母婴阻断、美沙酮维持治疗等转介服务。

☐所有科室住院部:

☐以下门诊：

✓皮肤性病科

✓泌尿科

√妇产科

✓肛肠科

✓结核病科（结核病防治机构）



中国人民解放军
联勤保障部队第九一〇医院



PITC你了解吗?

四、服务对象

- ✓ 艾滋病病毒感染者或病人的配偶和性伴
- ✓ 具有吸毒、卖淫嫖娼、多性伴、同性性行为的就诊者
- ✓ 具有HIV和性病感染症状、体征的患者
- ✓ 性病门诊就诊者
- ✓ 结核病患者
- ✓ 丙肝患者
- ✓ 手术前、住院以及有创伤检查的患者
- ✓ 婚前体检者
- ✓ 孕产妇
- ✓ 艾滋病病毒感染者所生的婴儿等

五、医疗机构HIV检测工作内容

- ◎ 检测前咨询
- ◎ 艾滋病抗体检测
- ◎ 检测后结果的告知和咨询
 - 初筛阴性
 - 初筛阳性
 - 艾滋病抗体确证结果处理