

可能性很大，如果免疫功能保持正常水平，感染者预期寿命可以接近正常人。而且，服药抑制了病毒复制，能够帮助保持CD4细胞的水平，使身体的整体状况较好，可以提高患者的生活质量，减少艾滋病病毒传播。

四、法律法规

艾滋病毒感染者也是艾滋病的受害者，应该得到理解和关心，但故意传播艾滋病的行为既不道德，又要承担法律责任。艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的各项权利受到法律保护。《传染病防治法》规定，“任何单位和个人不得歧视传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人”。《艾滋病防治条例》规定，“任何单位和个人不得歧视艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属。艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属享有的婚姻、就业、就医、入学等合法权益受法律保护”。艾滋病是一种传染病，艾滋病感染者有责任告知与自己发生性关系者自己的感染状态，并规范自己的相关行为以避免将疾病传播他人。故意隐瞒和传播艾滋病是



一种极其不道德的行为，同时也违反了国家法律关于故意传播传染性疾病的规定，需要承担相应的法律责任。《艾滋病防治条例》第38条规定，“艾滋病病毒感染者和艾滋病病人不得以任何方式故意传播艾滋病”。《传染病防治法》第77条规定，“单位和个人违反本法规定，导致传染病传播、流行，给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担民事责任”。

衡阳市及各县市区疾病预防控制中心
均可提供HIV免费咨询与检测

单位名称	地址	咨询电话
衡阳市疾病预防控制中心	雁峰区和平南路17号	0734-8209152
雁峰区疾病预防控制中心	雁峰区黄青巷5号	0734-8517336
蒸湘区疾病预防控制中心	蒸湘区红湘北路6号	0734-2891515
石鼓区疾病预防控制中心	石鼓区古汉大道11号	0734-8172481
珠晖区疾病预防控制中心	珠晖区湖北路千子里3号	0734-8161142
南岳区疾病预防控制中心	南岳区南岳镇万福路66号	0734-5662347
衡阳县疾病预防控制中心	衡阳县西渡镇清江中路32号	0734-6650832
衡南县疾病预防控制中心	衡南县云集镇新塘路	0734-8983018
衡山县疾病预防控制中心	衡山县开云镇开云新城九龙大道	0734-5820551
衡东县疾病预防控制中心	衡东县洣水镇衡东大道79号城	0734-5219036
祁东县疾病预防控制中心	祁东县永昌街道办曙光路卫生综合服务大楼	0734-6257705
耒阳市疾病预防控制中心	耒阳市五一东路256号	0734-4334221
常宁市疾病预防控制中心	常宁市宜阳镇月塘巷12号	0734-7244928

预防艾滋 远离毒品

(吸毒人群艾滋病防治知识)



衡阳市疾病预防控制中心

咨询电话：0734-8209152



一、艾滋病是一种危害大、死亡率高的传染病，目前不可治愈、无疫苗预防

感染艾滋病病毒后，人体的免疫系统会遭受严重破坏，导致一些机会性致病菌侵入人体引发严重疾病甚至引起死亡，对人身健康危害巨大且病死率很高。目前为止，还没有发现治愈艾滋病的方法，全世界仍无预防艾滋病病毒感染的疫苗问世。

一旦感染艾滋病病毒，患者需要终生进行治疗，终生服药会对肝、肾等代谢器官会产生一定影响，药物也会产生一些副作用。另外由于社会对感染者的歧视，也常常给感染者带来沉重的精神压力。晚期并发症的治疗可能给家庭和社会带来沉重的经济负担和社会问题。



二、远离艾滋

(1) 避免共用注射器、针头、过滤毒品的棉球或溶解毒品的容器，是预防艾滋病的有效方法之一。



注射吸毒感染艾滋病主要通过共用注射器、针头、过滤毒品的棉球或溶解毒品的容器。避免共用这些器具能有效预防艾滋病毒经注射吸毒传播。清洁针具是预防艾滋病经注射吸毒传播的重要策略之一。

(2) 坚持每次正确使用安全套，可有效减少感染、传播艾滋病和性病的风险。



(3) 避免使用新型毒品。使用毒品、特别是新型毒品会增加经性途径感染艾滋病病毒的风险。

(4) 参加戒毒药物维持治疗。戒毒药物维持治疗可以降低由吸毒造成的感染艾滋病病毒风险。

戒毒药物维持治疗是针对吸毒成瘾者采取的一种替代或维持治疗方法。通过长期持续治疗可减轻吸毒者对毒品的依赖，减少毒品使用及其造成的艾滋病传播风险。

(5) 暴露后预防用药。72小时内使用

暴露后预防用药可减少艾滋病病毒感染的风险。



三、检测与治疗

(1) 定期进行艾滋病检测与咨询，早发现、早诊断、早治疗。



建议至少每三个月检测一次HIV。知晓自己的检测结果，有助于尽早采取措施。新婚夫妇、备孕夫妻、孕早期孕妇尽早接受HIV抗体检测。检测结果若为阴性，则应该继续坚持安全行为，预防感染；检测结果若为阳性，则需要及早参加抗病毒治疗，保证自身寿命和生活质量不受严重损害。有生育意愿以及已怀孕的感染者，进一步至妇幼保健机构，咨询母婴传播信息，了解母婴阻断政策和策略。

疾控中心、医院等医疗卫生机构均能提供保密的艾滋病检测和咨询服务。已参加戒毒药物维持治疗的人群要根据门诊规定，定时参加HIV检测。

(2) 感染艾滋病病毒后及早接受抗病毒治疗可延长生命、提高生活质量，减少艾滋病病毒传播。

一旦感染艾滋病病毒，病毒复制即开始，全身多器官的损害就会发生，及早治疗能降低上述损害的严重程度；早治疗的病人免疫功能恢复到正常水平的