

感染了丙肝有哪些症状?

很多丙肝感染者没有症状,也不知道自己被感染。一些人会出现以下症状:发热、乏力、食欲不振、恶心、呕吐、小便赤黄、陶土样便、关节疼痛和皮肤、眼部的黄疸等。

急性丙肝: 症状出现在感染后的2周至6个月之间的任何时间。


慢性丙肝: 一般需要数十年才能表现出症状。一旦出现症状,往往是肝病晚期的征兆。



丙肝起病隐匿,早检测、早诊断、早治疗是关键。发生可能感染丙肝的行为或怀疑感染丙肝时,应及时咨询专科医生并主动寻求检测,传染病院、综合性医院专科门诊均可做丙肝检测。

丙肝患者一定要到正规医院,在医生的指导下,接受规范治疗。

目前丙肝的治疗已纳入医保减免,我县的定点治疗机构:永仁县人民医院




什么是梅毒?

梅毒是由梅毒螺旋体(也称苍白螺旋体)引起的全身性慢性疾病。可有全身多系统受累的各种临床表现,也可长期处于无症状的潜伏状态。

梅毒是如何传播的?

梅毒主要通过性接触传播。未经治疗的梅毒病人病期在1年内,传染性最强。未治疗的早期梅毒女病人还可经胎盘感染胎儿。非性接触,如输血、深吻、哺乳以及新生儿经过产道等也可造成梅毒而感染。




梅毒的主要表现是什么?

出生后感染的梅毒称“后天获得性梅毒”可分一期、二期和三期梅毒。

一期梅毒主要表现为硬下疳,一般表现为生殖器溃疡;

二期梅毒则可累及皮肤、粘膜,骨骼和神经系统等。一期和二期梅毒又称早期梅毒,有传染性。

三期梅毒为晚期梅毒,其特点是传染性很小,但对组织的破坏性较大,严重时可危及生命。没有临床表现,仅化验证实的梅毒感染称为隐性(潜伏)梅毒。通过胎盘(出生前)感染的梅毒称先天梅毒。



梅毒检测方便、准确,通过检测可及时发现梅毒感染

1、怀疑感染梅毒后应尽早到正规医疗机构进行梅毒检测,目前我县县乡各医疗机构都可提供梅毒检测。



2、发生了无保护性交、怀疑自己的性伴感染梅毒以及接触过可疑血液或与他人共用过注射器者,应及时到正规医疗机构接受梅毒的检测。

3、梅毒患者自觉通知配偶或性伴及时到正规医疗机构接受检查和治疗,是对自己 and 他人健康负责的行为。

梅毒患者应及时、规范治疗、定期复查

- 1、早期梅毒可以治愈,治疗越早,效果越好。
- 2、遵照医嘱完成治疗十分重要,自行停药、随意增减药物都会带来不良后果。
- 3、治疗后应随访2-3年;第一年每3个月复查一次,以后每半年复查一次,以观察治疗的效果。
- 4、梅毒患者应该到正规医疗机构进行诊治,不可自己到药店购药或到没有梅毒诊治资质的私人诊所治疗。



守住健康 才能幸福

艾滋病 丙肝 梅毒

——传染病预防知识




永仁县防艾办 宣

永仁县疾病预防控制中心
咨询电话: 0878—6719092
永仁县人民医院
咨询电话: 189 8784 6208

AIDS 什么是艾滋病

艾滋病全称为获得性免疫缺陷综合征 (AIDS)，是由人类免疫缺陷病 (HIV) 感染人体后，导致人体免疫系统部分或完全丧失，继而出现一系列机会感染或肿瘤，是一种病死率极高的严重传染病，目前还没有治愈的药物和方法，但可以预防。感染了艾滋病病毒如果得不到有效治疗，会逐步发展为艾滋病，将严重影响我们的身体健康，劳动力会逐步削弱，这对个人和家庭来说都是很大的伤害。

艾滋病的传播途径



什么人容易感染艾滋病?

- 1、静脉吸毒者及其伙伴、配偶；
- 2、多性伴者（包括同性恋和双性恋、暗娼、嫖客）及其配偶或性接触者；
- 3、性病患者及其配偶；
- 4、感染了艾滋病的妇女所生的孩子。




日常生活和工作接触不会感染艾滋病

在工作和生活中与艾滋病病人和艾滋病病毒感染者的一般接触（如握手、拥抱、共同进餐、共用工具、办公用具等）不会感染艾滋病。



艾滋病不会经马桶圈、电话机、餐饮具、卧具、游泳池或公共浴池等公共设施传播。咳嗽和打喷嚏不传播艾滋病。蚊虫叮咬不传播艾滋病。



艾滋病检测

如果怀疑自己被感染了艾滋病病毒或性病，可以到省、州、县、乡镇及部分村卫生室等医疗机构接受免费的艾滋病咨询和初筛检测，检测结果是保密的。




艾滋病的预防措施有哪些?

- 1、遵守法律和道德、洁身自爱、反对婚前性行为、反对乱性。
- 2、不搞卖淫、嫖娼等违法活动。
- 3、不以任何方式吸毒；有毒瘾者暂未戒除前切勿与他人共用注射器。
- 4、不使用未经检验的血液制品，减少不必要的输血。
- 5、不去消毒不严格的医疗机构打针、拔牙、针灸、美容或手术。
- 6、不共用剃须（刮脸）刀。
- 7、避免在日常工作、生活中沾上伤者的血液。
- 8、正确使用安全套有助于避免感染艾滋病。
- 9、患有性病后应及时、积极进行治疗，否则已存病灶会增加艾滋病感染的危险。

艾滋病的治疗


如果你已经感染艾滋病病毒，千万不要绝望，请及时治疗，国家免费为符合条件的艾滋病病毒感染者及病人提供抗病毒治疗药物，早期治疗可以很好保护免疫功能，提高生命质量。（永仁县人民医院为我县艾滋病定点医院）



在日常生活接触时，不必担心和恐惧，更不要因此而疏远和歧视他们，他们是疾病的受害者，我们有义务关心和帮助他们。



什么是丙肝?



丙型肝炎（简称丙肝）是由丙肝病毒（HCV）引起的一种传染病，病毒

主要侵犯肝脏，可导致慢性肝炎，部分患者可发展为肝硬化甚至肝癌，对患者的健康和生命危害极大。



丙肝是如何传播的?


血液传播是丙肝最主要的传播途径，特别是共用针具吸毒。

共用剃须刀、牙刷、纹身和穿耳孔等行为也可以传播丙肝。

丙肝可以通过性接触和母婴等途径传播。

握手、拥抱、共用餐具、咳嗽、打喷嚏、蚊虫叮咬不会传播。

不会传播



传播途径

