

HPV 的机率。但 HPV 可能感染避孕套未覆盖的部位，因此避孕套无法提供避免感染 HPV 的完全保护。应洁身自好，保持相互单一的性关系，避免高危性行为。

HPV 病毒 80% 的部分以休眠的状态潜伏在皮肤组织细胞的细胞核与神经节内，当人体免疫力下降时，这些病毒就会大量繁殖并游走到皮肤黏膜，引起病情复发。无保护措施性行为、和机体免疫功能低下者更容易导致 HPV 反复感染或尖锐湿疣反复发作。因此，安全健康的性行为、提高机体免疫功能对预防 HPV 感染、尖锐湿疣至关重要。



如何治疗？

① 治疗以局部去除疣体为主，必要时辅助抗病毒和提高免疫功能药物。

② 尖锐湿疣的判愈标准为治疗后疣体消失。治疗后 6-9 个月无复发者，则复发机会减少。

③ 患者的所有性伴都应接受检查和随访，应同时进行梅毒、HIV 感染的检测。

④ 提倡均衡的饮食和适当休息，避免过度劳累，防止免疫力下降导致复发。




尖锐湿疣 防治小知识



六盘水市卫生健康局
六盘水市疾病预防控制中心

什么是尖锐湿疣？

尖锐湿疣(condyloma acuminatum)是由人乳头瘤病毒(HPV)感染所致的以肛门生殖器部位增生性损害为主要表现的性传播疾病。



潜伏期半个月至8个月，平均为3个月

大多发生于18—50岁的中青年


传播途径




性接触传染



间接接触传染



母婴传播




尖锐湿疣临床表现

好发部位：生殖器和肛周

外观：乳头样、鸡冠状或菜花样突起

症状：常无自觉症状，部分病人可出现异物感、疼痛、瘙痒或性交痛

预后：治疗后一般预后良好。但不论何种方法治疗，均可能复发。



乳头样

菜花状

鸡冠状



尖锐湿疣怎么预防？

与携带 HPV 者发生性行为，可能使您感染。HPV 通过阴交或肛交传播最为常见。即便感染者没有任何症状，HPV 也能传染，症状可能在发生性行为多年后才出现。

HPV 疫苗安全、有效。疫苗用于建议年龄群体，可保护男性和女性避免 HPV 造成的疾病(包括癌症)。接受宫颈癌筛检，21 至 65 岁女性在专科医生指导下进行常规筛检能预防宫颈癌。

性活跃人士，在发生性行为时应正确使用避孕套，这可降低感染

