

性病是如何传播的？

①性行为——是最主要的途径,尤其是多性伴、经常变换性伴、嫖娼、卖淫等,更容易感染或传播性病。

②间接接触——如接触带有病原体的病人分泌物,或接触被病原体污染的衣物、用具、便器、浴盆等,也可造成传染,但这种情况很少见。

③血液传播——如早期梅毒,梅毒螺旋体可在患者的血液中潜伏一段时间,健康者或其他各种疾病的病人输入了感染的血液或血液制品,就可以使受血者感染梅毒。

④母婴传播——某些性病如梅毒、淋病、生殖器疱疹等通过胎盘、产道以及产后哺乳及密切接触而传染给胎儿、婴儿。

性病的危害如此大,我们如何预防性病呢?

★ 公共场所比如游泳池、酒店等注意个人卫生和防护;

★ 尽量避免进入不正规的场所进行洗牙、纹身等有创操作外;

★ 更重要的是要避免性接触传播,避免和不熟悉的人发生性关系;

★ 提倡婚前检查,即开始性生活前进行双方传染病筛查;

★ 对于有性病高危因素者,比如多性伴、或性伴曾有多性伴者、职业性工作者、曾感染过性病者、吸毒者等,定期进行性病检测;

★ 到正规医疗机构皮肤病/性病门诊进行检测咨询。

性病防治知识要点

一、性病是以性接触为主要传播途径的一组传染病,其流行广泛。

二、性病患者因生殖器局部皮肤黏膜的破损和炎症,更容易感染艾滋病病毒,及时治愈性病可减少艾滋病的感染和传播。

三、性病是可以预防的,避免多性伴、杜绝不安全性行为是主要预防措施,正确全程使用质量合格的安全套。

四、许多性病没有明显症状,大多数性病可以彻底治愈,关键是主动就诊、及时发现、尽早治疗。

五、到正规医疗机构接受规范诊疗,可以获得最佳的治疗效果并得到隐私保护。

六、预防控制性病是全社会的共同责任。



性传播疾病防治知识

共抗艾滋, 共享健康

——防治性病, 促进生殖健康



六盘水市卫生健康局
六盘水市疾病预防控制中心

性病防控宣传口诀

染性病	有危害	损健康	难根除
若染病	途径三	性和血	母传婴
禁高危	不性乱	安全套	能预防
有高危	早检测	早查出	延生命
是阳性	慎怀孕	早治疗	减传播
同学习	同工作	共餐饮	共毛巾
手握手	礼节吻	同游泳	共马桶
蚊虫叮	打喷嚏	飞唾沫	不传染
此性病	行为病	无疫苗	防才行
全社会	齐参与	共担责	健康行



什么是性病？

常见的性病有哪些？

在以前，性病指通过性行为而传播的疾病，如梅毒、淋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿，它们被称为“经典性病”。我国目前将下列 5 种常见的危害性大的性传播疾病列为重点防治的疾病：梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、生殖器疱疹、尖锐湿疣。

性传播疾病的危害是什么？

★ 危害个人 性病对个人的危害很大，它影响健康，如治疗不及时、不彻底可造成各种并发症、后遗症。此外，性病对病人心理上的创伤较大，可能产生严重的心理负担，影响正常的工作、生活，甚至使人丧失生活信心。

★ 危害家庭 性病很容易传染给配偶。污染的生活用品还可传染家人，造成性病在家庭内的传播。常由此引发家庭风波、夫妻不和、乃至婚姻危机。

★ 危害后代 患病的母亲可将性病病原体传染给胎儿或婴幼儿。孕妇患梅毒，梅毒螺旋体可通过胎盘传染给胎儿，发生流产、早产、死产、先天梅毒。淋球菌可通过母亲的产道感染新生儿，使婴儿患淋菌性眼炎（“脓漏眼”）。沙眼衣原体可引起新生儿眼结膜炎或肺炎等疾病，增加新生儿的死亡率。孕妇患生殖器疱疹、尖锐湿疣等同样可传染新生儿。

★ 危害社会 性病对社会的危害也极为重大。性病的流行与社会风气密切相关，嫖娼、卖淫、不安全的性接触、吸毒等现象是性病传播的高危因素，也是造成社会不安定的潜在因素。性病的蔓延不仅损害病人的身心健康，还会影响其劳动能力，更会增加国家的经济支出，有碍社会的发展。