

日常接触不传播，不必恐惧。



预防艾滋病国家有政策——四免一关怀

- 向接受治疗的艾滋病病人免费提供抗艾滋病病毒治疗药物；对生活困难的病人适当减免抗机会性感染的治疗费用。
- 向自愿接受检测的公众免费提供艾滋病初筛检测和咨询服务。
- 向感染艾滋病病毒的孕妇免费提供预防母婴传播的治疗和咨询服务。
- 向艾滋病致孤儿童和受到感染的未成年人免收义务教育的学杂费、书本费。减免学前至高中阶段教育的学费等相关费用。
- 向生活困难并符合救助条件的感染者、病人及家属给予生活救助；扶持有劳动能力的感染者从事力所能及的生产和工作。

艾滋病防治知识小问答

问题	答案
蚊虫叮咬会传播艾滋病病毒吗？	不会
与艾滋病病毒感染者或病人共餐会感染艾滋病吗？	不会
一个看似健康的人有可能会携带艾滋病病毒吗？	可能
与艾滋病病毒感染者共用注射器有可能得艾滋病吗？	可能
输入带有艾滋病病毒的血液会得艾滋病吗？	会
感染艾滋病病毒的妇女生下的小孩有可能得艾滋病吗？	可能
正确使用安全套可以降低艾滋病病毒传播的风险吗？	可以
只与一个性伴侣发生性行为可以降低艾滋病感染风险吗？	可以

艾滋病自愿咨询检测点

百色市疾病预防控制中心	0776-2834221
右江区疾病预防控制中心	0776-2963981
田阳县疾病预防控制中心	0776-3215296
田东县疾病预防控制中心	0776-5226951
平果市疾病预防控制中心	0776-5826056
德保县疾病预防控制中心	0776-3821529
靖西市疾病预防控制中心	0776-6231506
那坡县疾病预防控制中心	0776-6802808
凌云县疾病预防控制中心	0776-7618477
乐业县疾病预防控制中心	0776-7924199
田林县疾病预防控制中心	0776-2570397
隆林县疾病预防控制中心	0776-8206629
西林县疾病预防控制中心	0776-8685282

艾滋病抗病毒治疗点

百色市人民医院	0776-2851194
右江区人民医院	0776-2867799
田阳县人民医院	0776-3217994
田东县人民医院	0776-5221235
平果市人民医院	18007861089
德保县人民医院	0776-3830016
靖西市人民医院	0776-6221194
那坡县人民医院	0776-6825743
凌云县人民医院	0776-7612907
乐业县人民医院	0776-7925965
田林县人民医院	0776-7210481
隆林县人民医院	0776-8207293
西林县人民医院	0776-8682155

美沙酮药物维持治疗点

右江区人民医院	0776-2662828
田阳县田州镇卫生院	0776-3223676
田东县疾病预防控制中心	0776-5225613
平果市皮防站	0776-2587524
德保县疾病预防控制中心	0776-3820136
靖西市疾病预防控制中心	0776-6228656

艾滋病母婴阻断机构

百色市妇幼保健院	0776-2832744
右江区妇幼保健院	0776-2829128
田阳县妇幼保健院	0776-3230198
田东县妇幼保健院	0776-5230499
平果市妇幼保健院	0776-5821995
德保县妇幼保健院	0776-3822834
靖西市妇幼保健院	0776-6212461
那坡县妇幼保健院	0776-6820033
凌云县妇幼保健院	0776-7617461
乐业县妇幼保健院	0776-7922119
田林县妇幼保健院	0776-7212325
隆林县妇幼保健院	0776-8205686
西林县妇幼保健院	0776-8684862

预防艾滋病宣传教育知识 “应知应会”手册



艾滋病可以预防
为了自己和家人
做出您明智的选择！

德保县疾控中心 宣



携手抗艾
重在预防

一、什么是艾滋病？

艾滋病学名获得性免疫缺陷综合症，由HIV（人类免疫缺陷病毒）引起的一种病死率很高的严重传染病，这种病毒能够破坏人体T淋巴细胞进而导致人体丧失免疫功能。丧失免疫功能的人极易感染各种疾病或发生恶性肿瘤，进而威胁人的生命。艾滋病目前尚无有效的疫苗和治愈方法，但是可以预防，而普及艾滋病知识和改变不良行为是预防和控制艾滋病的重要措施。

感染艾滋病病毒的人也称艾滋病病毒感染者，一般经过潜伏期发展成为艾滋病病人。他们在发病前外表上与常人无异，可以没有任何症状地生活和工作，但能将病毒传染给他人。

当艾滋病病毒感染者发展成艾滋病病人后，由于发生了复杂多样的感染、肿瘤等继发性疾病，无法治愈，健康状况会迅速恶化，病人极度消瘦，体貌惨不忍睹，身体上要承受巨大的痛苦，很快死亡，寿命缩短。

二、艾滋病是如何传播？

艾滋病病毒主要存在于艾滋病病毒感染者和病人的血液、精液、阴道分泌物、乳汁和伤口渗出液中。有三种传播途径：性传播、血液传播、母婴传播。

性传播

艾滋病病毒可通过性交的方式在男女之间和男男之间传播。性伙伴越多，感染的危险越大。




血液传播

共用注射器吸毒、到非法血站卖血、输入被艾滋病病毒污染的血液和血制品、使用未经严格消毒的针具和器械等都可能感染。



母婴传播

感染了艾滋病病毒的妇女在怀孕、分娩和喂奶时，可将病毒传染给孩子。



三、怎样预防艾滋病？

洁身自好，避免多性伴，夫妻之间互相忠诚，可以减少患性病和艾滋病的危险。



性生活使用安全套，避孕又防病，上环、结扎等避孕方法都不能预防性病和艾滋病。



教育孩子不吸烟，不沾毒。



打针输液要求用一次性或消毒严格的针具，输血要求用检测合格的血。



妇女怀孕后，请到各医疗卫生单位接受艾滋病咨询检测，如感染了艾滋病病毒，应接受母婴阻断服务。

